

主な感染症一覧 ※発症した場合、登園には治癒証明書(西東京市内の医療機関にて無料で発行)が必要です。

病名	病原体	感染経路	潜伏期	早期～主症状	登園停止期間
インフルエンザ	インフルエンザウイルス	飛沫感染	1～2日	突然の発熱(さむけを伴う39℃以上の高熱)・頭痛 倦怠感・関節痛・筋肉痛	解熱後2～3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	ムンプスウイルス	飛沫感染	2～3週間	耳下腺の痛み・腫れ	耳下腺の腫れがなくなるまで
水痘(みずぼうそう) 帯状疱疹	水痘ウイルス	飛沫感染	2～3週間	発疹(水泡～かさぶた)発熱	すべての発疹がかさぶたになるまで
流行性嘔吐下痢症	ロタウイルス等	経口感染 (飛沫感染)	1～3日	嘔吐・発熱・下痢	下痢・嘔吐がおさまるまで
溶連菌感染症	溶血性連鎖球菌	飛沫感染	2～5日	発熱・発疹(首・胸・下肢) のどの痛み・リンパ腺の腫れ	治療開始後2日以上たち、発熱がなければ
麻疹(はしか)	麻疹ウイルス	飛沫感染	10～12日	発熱(3～4日)・発疹(首～全身) かぜ症状・目やに	解熱後3日を経過するまで
風疹(3日はしか)	風疹ウイルス	飛沫感染	2～3週間	発熱・発疹・リンパ腺の腫れ・痛み	発疹がなくなるまで
手足口病	コサッキー A16 型 エンテロウイルス 71 型	経口感染	3～5日	手のひら・足の裏等に水泡 口内炎・発熱・食欲不振	解熱後
伝染性紅斑症 (りんご病)	パルボウイルス	飛沫感染	10～20日	頬の紅斑	医師の指示による
マイコプラズマ感染症	マイコプラズマ菌	飛沫感染	2～3週間	発熱・強い咳	病状の改善後
ヘルパンギーナ	コサッキー A 群ウイルス	飛沫感染	2～4日	38～39℃の発熱(1～4日間位) のどの痛み・口中の小水泡	解熱後
咽頭結膜炎 (プール熱)	アデノウイルス 3 型・7 型	飛沫感染	5～7日	39℃位の発熱(午後から夕方にかけて) のどの腫れ・痛み 結膜炎	すべての症状が消失後2日を経過するまで
流行性角結膜炎	アデノウイルス 8 型	接触感染	5～12日	目がゴロゴロする・目やに 充血・発熱	伝染のおそれなくなるまで
急性出血性結膜炎 (アポロ病)	エンテロウイルス 70 型	接触感染	1～2日	充血	伝染のおそれなくなるまで
病原性大腸菌感染症 (腸管出血性大腸菌感染症) O-157	大腸菌	経口感染	3～8日	下痢・腹痛・血便	伝染のおそれなくなるまで
百日咳	百日咳菌	飛沫感染	7～10日	ヒューヒューという特有の咳	特有の咳が消失するまで
ウイルス性肝炎 (A 型肝炎)	A 型肝炎ウイルス	経口感染	14～40日	発熱・全身倦怠感・食欲不振 嘔吐・下痢	発病所期を過ぎるまで
伝染性膿痂疹 (とびひ)	黄色ブドウ球菌 連鎖球菌	接触感染	2～10日	虫刺され等のかきこわしから 小水泡・ジクジクとした浸出液で 他に感染	医師の指示による
突発性発疹症	ウイルス	接触感染	約 10 日	突然の 39～40℃の高熱 (3日間)その後バラ色の発疹	医師の指示による
RS ウイルス感染症	RSV	飛沫感染	2～8日	発熱・鼻汁・咳・喘鳴 呼吸困難	呼吸器症状が消失するまで